

الإسعافات الأولية لإصابة أسنان طفلك

في مكان عام تعرض أحد الأطفال أمامك لإصابة أدت إلى سقوط أحد أسنانه كلياً من مكانه ، طُلب منك التصرف بشكل عاجل ، هل تعرف ماذا تفعل ؟؟؟



قد لم يسبق لك من قبل التفكير بالطريقة السليمة لإسعاف مثل هذه الحالة ، لكن حسن و سرعة تصرفك قد يزيد من فرصة المحافظة على هذا السن و رجوعه إلى حالته الطبيعية .

في هذه المقالة سوف نقوم بطرح العديد من النقاط التي سوف تساعدك على التصرف السليم والسريع بإذن الله فيما لو واجهتك هذه الحالة .

سقوط الأسنان الدائمة :

غالباً ما يحدث سقوط الأسنان الدائمة عند الأطفال كثيري الحركة أو عند بعض البالغين ، والتصرف الصحيح يكون كالتالي:

١- امسك السن من جزء التاج (الجزء الظاهر بالفم) و حاول اعادته إلى مكانه بالفم .

٢- تجنب لمس جذر السن و ذلك لاحتوائه على خلايا حية تساعد على بقاء السن في مكانه.

٣- اذهب إلى طبيب الأسنان بأسرع وقت ممكن حتى يتمكن من تثبيته بمكانه الصحيح .



ماذا لو سقط السن في مكان متسخ ؟

امسك السن من جزء التاج (الجزء الظاهر بالفم) ، اغسله بالماء البارد أو الحليب ، و تجنب دعك جذر السن حتى لا تتضرر خلاياه المهمة لاعادة السن ، أيضاً عليك تجنب استخدام مساحيق التنظيف المنزلية لتعقيم السن .

ماذا أفعل إذا لم أتمكن من إعادة السن إلى مكانه ؟؟

ضع السن بكأس حليب أو بمحلول ملحي و اذهب لزيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن . تأكد دائماً من الحفاظ على السن في مكان رطب و حافظ عليه من الجفاف.

يعتبر الحليب هو الوسط المثالي للحفاظ على السن يليه المحلول الملحي ، أما الماء فقد يضر الخلايا المتواجدة على الجذر السني . إذا لم يتوفر الحليب أو المحلول الملحي وقت الحادث فينصح باستخدام لعاب المريض (إما بوضع السن داخل فم المصاب بين الخد و اللثة ، أو اطلب من المصاب أن يبصق بوعاء ثم احفظ السن بداخله حتى يتمكن من زيارة الطبيب)

ماذا سيفعل طبيب الأسنان ؟

سيبدأ طبيب الأسنان بالتأكد من وضعية السن ثم سيقوم بتثبيتته بمكانه باستخدام أسلاك التقويم لمدة لا تتجاوز الاسبوعين غالباً . و إذا كان جذر السن مكتمل سوف يقوم طبيب الأسنان خلال ١٠-١٤ يوم من اعادة السن بإزالة العصب السني وتنظيف القنوات لمنع حدوث التهابات مستقبلية .

ماهي نسبة نجاح عملية إعادة السن إلى مكانه ؟

تعتمد نسبة نجاح عملية إعادة السن إلى مكانه على عدة عوامل أهمها :
١- سرعة إعادة السن إلى موقعه (سرعة اعادة السن تضمن فرصة نجاح أعلى)
٢- الوسط المستخدم لحفظ السن خارج الفم.

ماذا لو سقط سن لبني ؟

غالبا ما يبدأ التساقط الطبيعي لهذه الأسنان بعمر ٦-٧ سنوات، وحتى في حال سقطت بعمر أبكر فيجب عدم إعادتها لمكانها حتى لا تضر الأسنان الدائمة الموجودة داخل عظم الفكين والتي تكون في طور التكوين.